

Amor y cuidado después de las vacunas



Su niño ha recibido una vacuna que puede causar fiebre.










Para prevenir la fiebre en su niño:

- ♥ Dé la dosis recomendada de Tylenol o acetaminofen cada 4 a 6 horas (vea el otro lado de esta hoja).
- ♥ Es **IMPORTANTE** que por los siguientes 2 días, dé más líquidos de lo usual:
 - ◆ Bebés (biberón, leche materna)
 - ◆ Niños mayores (agua, jugo, etc.)
- ♥ Para más información, haga referencia a las hojas de información de las vacunas que usted recibió durante su visita a la clínica.
















¿Cuanta medicina (Tylenol, acetaminophen) debo de darle a mi niño Para bajarle la fiebre?

Dosis de ibuprofen se debe de dar cada 6-8 horas, de acuerdo a edad o peso.

<p>1-3 meses 6-11 lbs. $\frac{1}{2}$ Gotero</p> 	<p>4-11 meses 12-17 lbs. 1 Gotero entero</p>  <p style="text-align: center;">$\frac{1}{2}$ teaspoon children's liquid</p> 	<p>12-23 meses 18-23 lbs 1 $\frac{1}{2}$ Gotero o</p>  <p style="text-align: center;">$\frac{3}{4}$ cucharadita de medicina para niño</p> 	<p>2-3 años 24-35 lbs. 2 tabletas masticables (80 mg)</p>  <p style="text-align: center;">1 cucharadita de medicina para niño</p> 	<p>4-5 años 36-47 lbs. 3 tabletas Masticables (80 mg) o</p>  <p style="text-align: center;">1 $\frac{1}{2}$ cucharadita de medicina para niño</p> 
--	---	--	--	---

¿Cuanta medicina (Motrin, ibuprofen) debo de darle a mi niño para bajarle la fiebre?

Dosis de ibuprofen se debe de dar cada 6-8 horas, de acuerdo a edad o peso.

<p>0-5 meses 6-11 lbs.</p> <p>No Dropper</p>  <p>No Tablet</p>  <p>No Elixir</p> 	<p>6-11 meses 12-17 lbs. 1 Gotero entero</p>  <p>No Elixir</p>  <p>No Tableta</p> 	<p>12-23 meses 18-23 lbs 1 $\frac{1}{2}$ Gotero</p>  <p>No Elixir</p>  <p>No Tableta</p> 	<p>2-3 años 24-35 lbs.</p> <p>No Tableta</p>  <p style="text-align: center;">1 Cuchardita de medicina para niño</p> 	<p>4-5 años 36-47 lbs. 3 tabletas Masticables (85mg)</p>  <p style="text-align: center;">1 $\frac{1}{2}$ teaspoon children's liquid</p> 
--	---	---	--	---