

TRATAMIENTO DE SU PAREJA CONTRA LA GONORREA



¿Por qué me recetaron este medicamento?

Usted estuvo expuesto a la gonorrea, por lo que es importante que reciba el tratamiento adecuado.

¿Qué sucede si no tengo una enfermedad de transmisión sexual (ETS)?

Muchas ETS, incluida la gonorrea, no tienen síntomas. Recibe este tratamiento porque tuvo relaciones sexuales con alguien que tiene gonorrea y usted pudo haberse infectado.




¿Es importante ver a un médico?

Sí. Es recomendable que consulte a su proveedor de atención médica y se haga una prueba de detección de ETS (incluido el VIH). Puede tener más de una ETS al mismo tiempo.



¿Qué es este medicamento?

El medicamento que le recetaron es un antibiótico llamado cefixima (cefixime). Este medicamento solamente cura la gonorrea. No cura ninguna otra ETS.



NO TOME este medicamento si:

- Tiene dolor pélvico, calambres, dolor durante el sexo, vómitos, dolor en los testículos, o fiebre.
- Es alérgico o ha tenido una reacción adversa, sarpullido o alergia a algún antibiótico.
- Tiene problemas de salud serios como enfermedad renal, cardíaca o hepática, convulsiones o actualmente toma anticoagulantes.

Si cumple alguno de los puntos antes mencionados, visite a un proveedor de atención médica lo antes posible para recibir un tratamiento alternativo.

Más información al dorso...



ARIZONA DEPARTMENT
OF HEALTH SERVICES

PREPAREDNESS

TRATAMIENTO DE SU PAREJA CONTRA LA GONORREA (cont.)



¿Cómo debo tomar el medicamento?

- Tome todas las píldoras de una vez, de forma oral. No comparta sus medicamentos. Para que haga efecto, debe tomarlo todo.
- Tómelo en ayunas (al menos una hora antes de comer o dos horas después de comer).
- Si vomita habiendo transcurrido menos de una hora de haber tomado los medicamentos, tendrá que conseguir más porque no tuvieron tiempo de hacer efecto.

¿Qué debo hacer tras tomar el medicamento?

NO TENGA RELACIONES SEXUALES (vaginales, orales ni anales) durante al menos 7 días después de que, tanto usted como su pareja, hayan recibido el tratamiento. **El medicamento tarda 7 días en hacer efecto.**

Puede contraer gonorrea nuevamente si tiene relaciones sexuales antes de que el medicamento los cure a usted y a su pareja(s). Además, debe hacerse otra prueba de detección de la gonorrea 3 meses después del tratamiento.



¿Y si decido no tomar el medicamento?

Si decide no tomar el medicamento, debe visitar a un proveedor de atención médica para hacerse pruebas de ETS lo antes posible. La gonorrea que no recibe tratamiento puede causar graves problemas de salud.



¿Y si tengo alguna pregunta?

Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos o las ETS en general.

